

Düngertyp:**AT:** Organischer Dünger, einzelgenehmigt gemäß

§ 9 Düngemittelgesetz 2021

DE: Organischer NK-Dünger, flüssig**CH:** Organische Dünger-Lösung**Zusammensetzung:**Ausgangsstoffe: Melasse, Vinasse, Algenextrakt,
hydrolysierte Proteine aus tierischen

Nebenprodukten

75 % Organische Substanz in der Trockensubstanz

3 % Organisch gebundener Stickstoff (N)

3 % Kaliumoxid gesamt (K₂O)**pH-Wert:** 5 - 6**AMALGEROL ESSENCE** entspricht der Verordnung (EU) 2018/848 idgF und ist daher für die biologische Landwirtschaft zugelassen.**Inverkehrbringer AT & DE:**

Hechenbichler GmbH

A-6020 Innsbruck, Cusanusweg 7-9

Tel.: +43 512 291810, Fax: -23

E-mail: office@amalgerol.com

Inverkehrbringer CH:

Amelgo Vertriebs AG

CH-9050 Appenzell, Rütistrasse 55

Tel.: +41 71 4111252

Sicherheitshinweise: Haut- und Augenkontakt sowie das Einatmen und Verschlucken vermeiden. Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nach Gebrauch Hände waschen. Schutzbrille tragen. Bei Augenkontakt Augen mit Wasser ausspülen. Beim Einatmen oder Verschlucken Mund ausspülen, reichlich Wasser nachtrinken, kein Erbrechen hervorrufen. Bei anhaltenden Beschwerden ärztliche Hilfe konsultieren und Etikett oder Sicherheitsdatenblatt vorweisen.**Lagerung:** Originalverpackt trocken in gut belüfteten Räumen zwischen +5 °C und +25 °C lagern. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Verpackung dicht verschlossen halten. Getrennt von Lebensmitteln und Futtermitteln lagern. Für Kinder und Haustiere unerreikbaar aufbewahren!**Haltbarkeit:** Das Produkt ist bei sachgerechter Lagerung mindestens 24 Monate ab Produktionstag (siehe Chargennummer) verwendbar.**Entsorgung:** Nach Möglichkeit verbrauchen. Unverwertbare Reste entsprechend den geltenden örtlichen und nationalen Bestimmungen entsorgen. Verpackungen gründlich restentleert in den dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgen.**15 l (18,45 kg)**www.amalgerol.com**ANWENDUNGSEMPFEHLUNG**

Düngemittel zur Verwendung in der Landwirtschaft und im Gartenbau. Flüssigdünger zur Anwendung auf Blatt oder Boden. Nur bei tatsächlichem Bedarf verwenden. Empfohlene Aufwandmengen nicht überschreiten.

Kompatibilität: AMALGEROL ESSENCE ist mit Pflanzenschutzmitteln und Produkten anderer Hersteller mischbar. Bei Verwendung mehrerer Produkte in einer Tankmischung können jedoch Wechselwirkungen auftreten. Die Durchführung von Misch- und Verträglichkeitstests wird daher empfohlen. Vorsicht bei Kombination mit kupferhaltigen Produkten. Die Gebrauchsanleitungen aller verwendeten Produkte sind zu beachten.**Mischanleitung und Anwendung:** Behälter vor Gebrauch sorgfältig schütteln, Großgebilde aufrühren! Tank halb mit Wasser füllen, Mixer einschalten und AMALGEROL ESSENCE über einen Filter begeben. Tank auffüllen, während des gesamten Spritzvorgangs rühren! Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen! Geräte nach Anwendung vorschriftsmäßig reinigen. Die Wartezeit zwischen der letzten Anwendung und der Ernte beträgt mindestens 3 Tage. Nicht bei ungünstigen Wetterbedingungen anwenden, wie hohe Temperaturen und große Windschwindigkeiten.**Aufwandmengen und Anwendungszeitpunkte:**Empfohlene Aufwandmenge: **3 l AMALGEROL ESSENCE** pro Hektar in **150 - 250 l Wasser**. Neben den nachfolgend empfohlenen Zeitpunkten empfehlen wir zusätzlich die Anwendung in allen Situationen mit erhöhtem Pflanzenstress.**Getreide:** bei Bestockung (BBCH 20 - 30); Blühbeginn (BBCH 61); zur Förderung der Strohrotte auf das Stroh, danach zügig einarbeiten**Raps:** im Herbst im 4-5-Blatt-Stadium (BBCH 14 - 15); im Frühjahr zum Längenwachstum (BBCH 30); zur Knospenbildung (BBCH 50)**Mais:** vor dem Anbau einarbeiten; im 4-8-Blatt-Stadium (BBCH 14 - 18); zur Förderung der Strohrotte auf das Stroh, danach zügig einarbeiten**Zuckerrübe:** 3 Anwendungen zwischen Reihenschluss (BBCH 30) und Ende Rübenwachstum (BBCH 49)**Bohne, Erbse, Sojabohne:** im 4-Blatt-Stadium (BBCH 14); zur Vorblüte (BBCH 55)**Sonnenblume:** vor dem Anbau einarbeiten; im 6-8-Blatt-Stadium (BBCH 16 - 18)**Ölkürbis:** vor dem Anbau einarbeiten; zum Reihenschluss (so spät wie möglich)**Kartoffel:** 3 Anwendungen zwischen Reihenschluss (BBCH 30) und 50% Knollengröße (BBCH 70)**Feldgemüse:** vor dem Anbau einarbeiten; 14 Tage nach dem Auflaufen / Auspflanzen, danach 2 - 4 Wiederholungen mit jeweils 10 - 14 Tagen Abstand**Wein, Obst:** 2 Anwendungen zwischen Austrieb bis Vorblüte, 2 - 4 Anwendungen zwischen abgehender Blüte bis Trauben-/Fruchtfärbung, Wassermenge gegebenenfalls erhöhen**Fertigation:** EC Wert 0,5%-ige Lösung; 0,1 mS/cm. Mit klarem Wasser nachspülen.